



Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Bogogno
Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Servizio tecnico Alto Piemonte Bollettino Difesa integrata Base Vite nr 10 del 2 LUGLIO 2017

PERONOSPORA

**SI CONSIGLIA DI RIPRISTINARE LA COPERTURA DEI VIGNETI
TRA MARTEDI 4 E MERCOLEDI 5 LUGLIO**

con formulati commerciali a base della più persistente forma del
-RAME (ossicloruro o solfato tribasico)

l'aggiunta di partner 'sistemici' contententi FOSFONATO DI POTASSIO (century), DIFOSFONATO DISODICO (quartet), fosetil-alluminio (aliette, elios, optix, prodeo et al) è indicata nei vigneti a maggior vigore vegetativo, onde proteggere le femminelle che mostreranno ulteriore crescita vigorosa dopo l'ultimo apporto idrico-
-l'aggiunta di CIMOXANIL (massimo 3 trattamenti/anno) è indicato nel caso che il nuovo intervallo temporalesco dovesse essere di maggior rilievo.

OIDIO (MAL BIANCO).BLACK ROT

In assenza di problematiche proseguire la difesa aggiungendo ZOLFO BAGNABILE a dosi medio/alte di etichetta (5 kg/ha). Ovvero in caso di infezioni in corso, situazioni più soggette, un ultimo trattamento con fungicidi a base di METRAFENONE (vivando **massimo 3 trattamenti/anno**) oppure CYFLUFENAMID(cydely, vineto, rebel top **2 trattamenti/max/ anno**) o TRYFLOXYSTROBIN (flint) o AZOXYTROBIN (quadris): max 3 trattamenti/anno nel complesso con Qoi) nelle situazioni più rischiose per il black rot

PRIMO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FD VEDERE SPECIFICO BOLLETTINO

POPILLIA JAPONICA. MAGGIOLINO GIAPPONESE

Il trattamento insetticida indicato per la Flavescenza Dorata ha parziale efficacia verso questo coleottero che sta facendo danni fogliari nei vigneti soprattutto dei comuni orientali delle novaresi (bogogno/marano/mezzomerico/suno ecc), ma è in da mettere in conto la sua espansione veloce. Attualmente non esistono sufficienti sperimentazioni/indicazioni tecniche sui trattamenti insetticidi specifici (fatta salva la registrazione di essi su vite contro questa avversità) e se ne è organizzata una ad hoc per verificarne l'efficacia. Le esperienze raccolte non sono del tutto convergenti, ma si consiglia di scegliere, con attenzione alla verifica dell'effetto, tra i fosforanici, il clorpirifos metile, e tra i neonicotinoidi l'acetamiprim.

LE AZIENDE CHE NON ADERISCONO ALLE MISURE AGROAMBIENTALI DEL PSR POSSONO UTILIZZARE ANCHE INSETTICIDI PIRETROIDI REGISTRATI SU SCAFOIDEO.

***!ATTENZIONE ALL'ETICHETTA DEGLI AGROFARMACI!!

LA LETTURA E CONOSCENZA DELLA STESSA è PRE-REQUISITO INDISPENSABILE PER UN LORO UTILIZZO EFFICACE E RIPORTA LIMITAZIONI DI UTILIZZO CHE HANNO VALORE LEGALE

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI
VIGASIO@VIGNAIOLI .IT

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)