



Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Bo-gog no
Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Servizio tecnico Alto Piemonte Bollettino Difesa integrata Base Vite nr 8 del 9 GIUGNO 2017

NEBBIOLI OLTRE GRANO PEPE E CROTINA IN PIENA ALLEGAGIONE NELLE ZONE MEDIE

PERONOSPORA

ESEGUIRE IL PROSSIMO TRATTAMENTO TRA (DOMENICA) LUNEDÌ 11 E MARTEDÌ 13

ESCLUDERE DA ORA PRODOTTI CONTENENTI, DA SOLI O ASSOCIATI: MANCOZEB, METIRAN, PROPINEB E DITIANON).

con formulati commerciali a base di **-RAME+METALAXIL-m** (Ridomil gold R, cumeta flow) o altri P.A appartenenti alla famiglia delle FENILAMMIDI COME **METALAXIL** (galben R 4.33) (3 trattamenti in totale/max per il gruppo delle FENILAMMIDI: (NB METALIX-m è diverso da METALAXIL!)

-AMETOCRADINA +FOSFONATODI K (ultimo trattamento)

-oppure la miscele della ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO) O ZOMAXIDE +RAME (electis zr, agron r)

con limite massimo/annuo/trattamenti: 4 per ZOXAMIDE. 3 per CIMOXANIL.

-Oppure, infine, CIMOXANIL+FOSETYL+RAME (vitene triplo R)

OIDIO (MAL BIANCO)

ATTENZIONE! E' ora l'avversità più pericolosa. Ricorrere preferibilmente a prodotti contenenti P.A appartenenti alla famiglia degli IBE. Quali: Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo.oppure i più limitati* ciproconazolo, difenoconazolo, miclobutanil propiconazolo, tebuconazolo

ATTENZIONE!!!! al limite di 3 trattamenti/annui/massimo COMPLESSIVI PER QUESTA FAMIGLIA!

AGGIUNGERE 2 KG/HA DI ZOLFO BAGNABILE COME PARTNER DI COPERTURA IN CHIAVE ANTIRESISTENZA SE NON CONTENGONO GIÀ ZOLFO (FORMULAZIONI COMBI)

Oppure in alternativa, alternandoli tra loro fungicidi a base di METRAFENONE (vivando) oppure CYFLUFENAMID(cydely, vineto, rebel top) oppure BUPIMIRATE (nimrod)

ogungo di essi con limite **massimo 3 trattamenti/anno** . **Soltanto 2 per cyflufenamid**

TRYFLOXYSTROBIN(flint) col limite massimo di 3 trattamenti/anno nel complesso con Qoi)

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

E' fondamentale avere la vegetazione a posto prima del trattamento (palizzatura, cimatura e sfogliatura). In particolare la sfogliatura fatta adesso è utile sia per questioni di sanita, che di qualità (grappoli più colorati) che per evitare ustioni future

!ATTENZIONE ALL'ETICHETTA DEGLI AGROFARMACI!!

LA LETTURA E CONOSCENZA DELLA STESSA è PRE-REQUISITO INDISPENSABILE PER UN LORO UTILIZZO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE
VIGASIO@VIGNAIOLI .IT

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)

ATTENZIONE AI DETTAGLI OPERATIVI DEL TRATTAMENTO: ASSENZA DI VENTO, VEGETAZIONE ASCIUTTA ED IN ORDINE, CORRETTA DISTRIBUZIONE SONO I PRIMI FATTORI INDISPENSABILI PER LA SUA EFFICACIA