



CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE COLLINE NOVARESI
Bollettino Difesa Integrata BASE VITE
nr 7 del 18 giugno 2019 ore 8.30

ATTENZIONE INSTABILITÀ TEMPORALESCA IN PROGRESSIVO AUMENTO FINO A SABATO

PERONOSPORA

E' CONSIGLIATO UN NUOVO TRATTAMENTO TRA OGGI E GIOVEDÌ 20.6

SEGUENDO ATTENTAMENTE LE AMPIE PARENTESI SOLEGGIATE

Utilizzando **PREFERIBILMENTE**

*****TRA PARENTESI SONO RIPORTATE LE LIMITAZIONI CONSIGLIATE NUMERICHE/TEMPORALI DI UTILIZZO DELLA SINGOLA SA O COMPLESSIVE DELLA FAMIGLIA/GRUPPO A CUI APPARTIENE .SL=SENZA LIMITAZIONI**

COPERTURA RAMEICI (5 KG RAME METALLO/ANNO. MAX. 12 KG/HA NEL TRIENNIO 2019-2021) O OVE NON PIENAMENTE ALLEGATO

***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA 'NON RAMEICI' (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : MANCOZEB (3 MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 MAX FINO ALLEGAGIONE) OPPURE METIRAM(SL-MA FINO ALL'ALLEGAGIONE)**

IN ASSOCIAZIONE A

***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : BENALAXYL (3MAX), BENALAXYL-M (3MAX), METALAXYL-M (3MAX), METALAXYL(1MAX). ASSOCIATI A OPPURE**

ZOXAMIDE (4 TRATTAMENTI /ANNO/ MAX) IN ASSOCIAZIONE A RAME OPPURE A CIMONAXIL (MASSIMO 3 TRATTAMENTI) OPPURE IN TRIPLA VIA INTERESSANTE

ZOXAMIDE+FOSETIL+CIMOXANIL (CIMOXANIL MASSIMO 3 TRATTAMENTI)

FOLPET+CIMOXANIL+FOSETIL

MANCOZEB+CIMOXANIL+FOSETIL

AI RAMEICI IN COPERTURA UTILE L'AGGIUNTA

***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX), FOSFONATO DI DISODIO (5MAX).**

OIDIO (MAL BIANCO) E ATTENZIONE AL BLACK.ROT

ALTERNARE AGLI IBE PRECEDENTEMENTE INDICATI

***FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO FAMOXADONE) : AZOXY-TRIFLOXY-PYRACLO-STROBIN (TUTTI 3MAX)**

Utile aggiungere zolfo in formulazione liquida in funzione rinforzante ed antidilavante

***FAMIGLIA/GRUPPO: CMR (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): PROQUINAZID (2MAX), BUPIMIRATE (2MAX), PYRIOFENONE (2MAX E 3 COMPLESSIVAMENTE CON METRAFENONE**

***FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : METRAFENONE (3MAX); PYRIOFENONE (2MAX)**

OPPURE CIFLUFENAMID(2MAX)

INFINE IN CHIAVE COMPLEMENTARE ANTIMUFFA§ SI Può UTILIZZARE

***FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : FLUXAPIROXAD (2MAX);**

BOSCALID

SEGUE §BOTRITE

L'annata è molto predisponente a problematiche relative che potranno presentarsi in fase vendemmiale. Nuove acquisizioni tecniche confermano l'utilità di un trattamento posizionato con **tempismo al TERMINE DELLA FIORITURA**. Nelle situazioni/vitigni storicamente problematiche si consiglia di utilizzare SA con effetto collaterale (TUTTE QUELLE SOTTOLINEATE) e.o. posizionare in aggiunta uno specifico prodotto antibotritico (SU FASCIA GRAPPOLO previa fondamentale sfogliatura)

FLUAZINAM (VEDI LIMITI COPERTURA 'NON RAMEICI')

SONO MOLTO INDICATI IN QUESTA FASE, ESSENDO PRODOTTI AMMESSI IN DIFESA BIOLOGICA O EQUIPARATI AD ESSA:

- EUGENOLO-TIMOLO-GERANIOLO (4 MAX.)
- PYTHIUM OLIGANDRUM POLYVERSUM (4 MAX)
- CEREVISANE
- BACILLUS SUBTILIS
- B. AMYLOLIQUEFACIENS
- AUREOBASIDIUM PULLULANS

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE
VIGASIO@VIGNAIOLI .IT

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)