



Servizio tecnico Alto Piemonte
Bollettino Difesa integrata Base
Vite nr 7 del XX GIUGNO 2018

!!ATTENZIONE SEMPRE ALL'ETICHETTA DEGLI AGROFARMACI!!

LA LETTURA E CONOSCENZA DELLA STESSA è PRE-REQUISITO INDISPENSABILE PER UN LORO UTILIZZO
"CONSAPEVOLE" ED EFFICACE... E A TUTTE LE SIGLE CHE SEGUONO IL NOME DEL PRODOTTO

perché NE INDICANO CARATTERISTICHE PECULIARI

ESEMPIO FORUM 50WP: SOLO DIMETOMORF 50% è ASSOLUTAMENTE DIVERSO DA

FORUM MZ

(DIMETOMORF 9% +MZ60%)

PERONOSPORA

**SETTIMANA PROSSIMA TORNA CRITICITA'. TI, OCCORRE PROTEGGERE LE FEMMINELLE
DA ESPLOSIONI DI MACCHIE E TUTELARSI DA FORMA LARVATA DEL PATOGENO**

**SI CONSIGLIA DI INTERVIRE CON UN NUOVO INTERVENTO
TRA DOMENICA 1 E LUNEDI 2 LUGLIO**

**RISPETTARE LE LIMITAZIONI D'USO INDICATE, SERVE A MANTENERE L'EFFICACIA DEI
PRODOTTI!**

Utilizzando

MISCELE A DOSI PIENE DI ZOXAMIDE + RAME *(PES CUPROXAT + ZOXIUM 240 SC). + IN CASO DI PRESENZA DI MACCHIE
NON SPORADICA, RISPETTANDO I LIMITI SOPRA INDICATI E/O IN CASO DI PROBLEMATICHE DI INTERVENTO IL
LUNEDI, NEL CASO SI INTERVENISSE POST PIOGGE- DA MERCOLEDI- ASSOCIARE ANCHE UNO A SCELTA TRA I
SEGUENTI P.A.: **DIMETOMORF**, IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, BENTIAVALICARB VALIFENALATE. **TUTTI
APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI CAA (MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI(ANNO MA MAX 3 DI FILA. IL
QUARTO EVENTUALE DEVE ESSERE INTERVALLATO CON PA DI DIVERSA FAMIGLIA)**

*UTILE L'AGGIUNTA, SE COMPATIBILE DI FOSFITI O FOSFONATI(QUARTET, CENTURY, ALEXIN)

MAX 4 TRATTAMENTI/ANNO CON ZOXAMIDE

OIDIO/BLACKROT: ATTENZIONE CON INCOLTI VICINI

IL BLACK ROT RAPPRESENTA UN'AVVERSITA' IN FORTE ESPANSIONE E SUBDOLA COME PREVEDIBILITA', E NON E' ESCLUSO UN SUO
ULTIMO COLPO DI CODA SU QUESTO PASSAGGIO UMIDO. PER CUI SI CONSIGLIA UNA SCELTA, TRA I PRODOTTI ANTIOIDICI, CHE VERTA SU
QUELLI CON SPICCATO ATTIVITA' COLLATERALE VERSO QUESTA AVVERSITA'.

OVE SI FOSSERO GIÀ UTILIZZATI IL MASSIMO DEGLI IBE: Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo oppure, **ciproconazolo,
difenoconazolo, flutriafol, miclobutanil ,propiconazolo, tebuconazolo: Attenzione!!!** La limitazione per gli IBE, nel complesso é di **3
trattamenti/anno** ma è consentito l'impiego per **UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO** degli ultimi 6 riportati in grassetto...

...L'alternativa- con le limitazioni riportate nell'apposito quadro- ricade sul , TRIFLOXYSTROBIN ((GRUPPO QOI)

In casi non problematici si possono utilizzare gli altri antioidici specifici: FLUXAPYROXAD(!!!ATTENZIONE MAX 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON
BOSCALID!!BUPIMIRATE oppure CYFLUFENAMID oppure METRAFENONE (limite massimo trattamenti/anno per metrafenone: 3. Per cyflufenamid e
bupimirate: 2)

**PRIMO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER
FLAVESCENZA**

(E POPILLIA JAPONICA EVENTUALMENTE)

VEDERE APPOSITO BOLLETTINO ALLEGATO E 7 BIS

**SI RICORDA A TUTTE LE AZIENDE (E' OBBLIGATORIO PER QUELLE ADERENTI ALLE MISURE AGROAMBIENTALI)
L'UTILITA' DI SFALCIO ERBA A FILARI ALTERNI. TALE OBBLIGO VIENE MENO NEL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DI
TRATTAMENTI INSETTICIDA QUANDO DIVIENE FONDAMENTALE LO SFALCIO SIMULTANEO DI TUTTI I FILARI PER
TUTELARE LE API**

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

VIGASIO@VIGNAIOLI .IT

**TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI
DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE
ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE
ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E
BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)**