

EMERGENZA POPILLIA JAPONICA - SUGGERIMENTI TECNICI



Buongiorno a tutti, da fine settimana scorsa arrivano segnalazioni di presenza del coleottero in vigna. Io stesso ho visto il primo esemplare a Barengo Mercoledì us. Ringrazio chi me lo ha segnalato personalmente. Questa settimana procederemo con i trattamenti insetticidi sperimentali cercando di proseguire le prove dell'anno scorso onde avere esperienza da spendere sul campo. ora ne abbiamo poca. Premesso che non ci sono attualmente insetticidi registrati su vite contro popillia riporto queste considerazioni e consigli già emersi in precedenti incontri ad hoc

-dobbiamo coprire un periodo di un mese circa di presenza dell'insetto con il minor numero di trattamenti insetticidi possibile

-possiamo sicuramente tollerare una presenza dell'insetto ed una defogliazione (vero che non sappiamo quanti ne arriveranno quest'anno.. ma in linea di massima fino ad una ventina di insetti/pianta possiamo tollerarli

-a "breve" posizioneremo il primo trattamento per la flavescenza, cercando di tararlo/anticiparlo per questa nuova emergenza

per cui consiglio: cercare di tenere lontano dal vigneto popillia con trattamenti repellenti (da fare subito)

l'anno scorso abbiamo visto un'efficacia del caolino (sourround) operativamente al doppio della dose di etichetta (50 kg/ha). si consiglia la dose di 5 kg/ettolitro massimo però (x miscibilità), ripassando eventualmente due -4 volte rispettivamente in caso di volume normale o basso volume

-provare ad utilizzare ZEOLITE come repellente (prodotto non testato, da verificare e vi prego di darmi feedback di efficacia

-interessante prodotto repellente non insetticida: DEMON della ditta kalos) a 5 l/ha. anche questo da provare.

inoltre è molto interessante verificare quali tipi di vite "americana" non sono soggetti all'attacco

buon lavoro a tutti