

**2017 DATE DEL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO**  
**CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA**



		DATE PRIMO TRATTAMENTO			DATE SECONDO TRATTAMENTO.				
		PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo)			PRODOTTI UTILIZZABILI				
		A	B	C	A	B	C		
		thiametoxam	clorpirifos etile***		Thiametoxam(21)	clorpirifos metile(15)	Etofenprox(14)		
		acetamiprid	clorpirifos metile		Acetamiprid(14)	clorpirifos etile(30)***	(Fenossibenilz eteri)		
		(neonicotinoidi)			(neonicotinoidi)	(fosfororganici)			
zone	siti	comune							
FOCOLAI	PRECOCI	BOGOGNO MARANO T.NO MEZZOMERICO SUNO				3-4 agosto	30-31 luglio	1-3 ago	OBBLIGATORIO
		BRIONA CRESSA FARA NO.SE BORGOMANERO BARENGO SIZZANO							
TARDIVI	TARDIVI	BOCA *****	SALVO INFO SPECIFICHE PROGETTO BOCAFDFREE			4-6 ago	1-2 agosto	3-4 agosto	
		CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S. <b>MAGGIORA</b>	CONSIGLIABILE EFFETTUARE II TRATTAMENTO						
		NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGNANO SESIA )			VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI				

\*\*\* E' SCONSIGLIATO (E VIETATO PER LE AZIENDE IN PSR) L'UTILIZZO DI CLORIPIRIFOS ETILE OLTRE IL 30 LUGLIO  
 ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA RIPORTATI TRA PARENTESI

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE

TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ADEGUATI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0( p.es con Aceto a mezzo litro/ha)

**VERIFICARE SEMPRE**

**ALTERNARE PA INSETTICIDI DI GRUPPI DIVERSI(A/B/C)**. PRIVILEGIANDO-ALL'INTERNO DEL GRUPPO/MOMENTO QUELLO IN **GRASSETTO**

**LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA**

P.ESEMPIO MEGLIO UTILIZZARE CLORPIRIFOS ETILE NEL 1^ TRATTAMENTO, CLORPIRIFOS METILE NEL SECONDO\*\*\*

**I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA**

E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE PIÙ COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO

NELLE ZONE INFESTATE DA POPILLIA OVE SI SIANO EFFETTUATI GIÀ DUE TRATTAMENTI CON PRINCIPI ATTIVI RIPORTATI IN A/B/C o con PIRETROIDI

non è necessario farne ulteriori. Su Americana Valutare uso di Piretroidi (1 solo trattamento/anno) o intervenire in post vendemmia come strategia alternativa

**PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)**

**SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. OBBLIGO SFALCIO PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)**

Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata da metcalfa nei mesi di luglio e agosto.

Nel caso di presenza di melata, per evitare apicidi, è utile intervenire in precedenza con un trattamento con sali potassici per il lavaggio della melata